ESERCIZI DI ANALISI MATEMATICA

GRAZIANO CRASTA

Notazioni. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ = insieme dei numeri naturali, $\mathbb{N}^+ = \mathbb{Z}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ = insieme dei numeri naturali positivi, $\mathbb{Z}$ = insieme degli interi relativi.

= esercizio difficile,

= esercizio molto difficile.

Esercizio 1. Sia (x_n) una successione a termini positivi. Dimostrare che

$$\liminf_n \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf_n \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_n \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_n \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

Concludere che, se esiste $\lim_n \frac{x_{n+1}}{x_n} = L$, allora esiste anche $\lim_n \sqrt[n]{x_n} = L$.

Esercizio 2. Dimostrare che

$$\lim_n \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = e.$$

Esercizio 3 (Teorema di Cesaro–Stolz). Siano (x_n) e (y_n) due successioni di numeri reali, con (y_n) strettamente monotona crescente e divergente a $+\infty$. Dimostrare che valgono le seguenti disuguaglianze:

$$\liminf \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \leq \liminf \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup \frac{x_n}{y_n} \leq \limsup \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

Concludere che, se esiste $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = L$, allora esiste anche $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ e vale L .

Esercizio 4. Dimostrare che

$$\lim_n \left[\prod_{k=0}^n \binom{n}{k} \right]^{\frac{1}{n(n+1)}} = \sqrt{e}.$$

Esercizio 5 (Iterate di Gauss). Siano $a_0, b_0 \geq 0$, e si considerino le successioni definite per ricorrenza da

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dimostrare che le due successioni convergono allo stesso limite; inoltre, con l'eventuale eccezione del primo termine, la successione (a_n) è monotona decrescente, mentre (b_n) è monotona crescente.

Esercizio 6 (Lemma di sub-additività). Sia $(x_n)_n$ una successione tale che $x_{m+n} \leq x_m + x_n$ per ogni $n, m \in \mathbb{N}$. Dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n} = \inf_{n \geq 1} \frac{x_n}{n}.$$

(In particolare il limite esiste finito oppure vale $-\infty$.)

Esercizio 7. Sia $\sum a_n$ una serie convergente a termini non negativi.

- (a) Dimostrare che, se esiste $\lim_n na_n$, allora tale limite è nullo.
- (b) Mostrare, con un esempio, che può succedere che la successione (na_n) non ammetta limite.

Esercizio 8 (Criterio di convergenza di Raabe). Sia data una serie $\sum a_n$ a termini positivi. Si dimostri che:

- (a) se $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1$ definitivamente, allora $\sum a_n$ è divergente;
- (b) se esiste $c > 1$ tale che $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq c$ definitivamente, allora $\sum a_n$ è convergente.

Esercizio 9. Determinare il carattere della serie $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n}$ al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, dove

$$\binom{\alpha}{n} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad n \in \mathbb{N},$$

sono i coefficienti binomiali generalizzati.

Esercizio 10 (Criterio di convergenza di Kummer). Sia $\sum a_n$ una serie a termini positivi. Si dimostri che:

- (a) se esistono una successione di numeri positivi (t_n) ed un numero $c > 0$ tali che:

$$t_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - t_{n+1} \geq c$$

definitivamente, allora la serie $\sum a_n$ converge;

- (b) se esiste una successione di numeri positivi (t_n) tale che:

$$t_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - t_{n+1} \leq 0$$

definitivamente e $\sum 1/t_n$ diverge, allora la serie $\sum a_n$ diverge.

Osservazione: per $t_n = n$ si ha il criterio di Raabe enunciato nell'Esercizio 8.

Esercizio 11. Sia (p_n) una successione a termini positivi, strettamente crescente e divergente a $+\infty$. Dimostrare che, se $\sum a_n$ è una serie convergente, allora

$$\lim_n \frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k = 0.$$

Esercizio 12. Dimostrare che, per ogni $n \geq 1$, esiste $\theta_n \in (0, 1)$ tale che

$$e = s_n + \frac{\theta_n}{n! \cdot n}, \quad \text{con } s_n := \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

Dimostrare inoltre che $\lim_n \theta_n = 1$.

Esercizio 13. Dimostrare che

$$\lim_n n \sin(2\pi en!) = 2\pi.$$

Esercizio 14. Dimostrare che la successione

$$a_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n$$

è monotona decrescente e positiva. (Di conseguenza (a_n) è convergente; il suo limite viene indicato con $\gamma = 0.5772156649\dots$ ed è detto *Costante di Eulero–Mascheroni*.)

Esercizio 15. Sia (x_n) una successione di numeri non negativi, tali che

$$x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

Dimostrare che tale successione è convergente.

Esercizio 16 (Densità naturale). Sia $A \subset \mathbb{N}^+$ un sottoinsieme dei numeri naturali positivi. Per ogni $n \in \mathbb{N}^+$ indichiamo con $|A_n|$ la cardinalità dell'insieme $A_n := A \cap [1, n]$. Diremo che A ha *densità naturale* pari a $d(A) \in [0, 1]$ se esiste il limite

$$d(A) = \lim_n \frac{|A_n|}{n}.$$

Dimostrare che, se $\sum_{k \in A} \frac{1}{k}$ è convergente, allora $d(A) = 0$.

Esercizio 17. Sia $\alpha > 0$ un numero irrazionale. Dimostrare che l'insieme

$$P := \{\alpha n \bmod 1 : n \in \mathbb{N}\}$$

è denso in $[0, 1]$ (si ricordi che $x \bmod 1$ è la parte frazionaria del numero reale x).

In realtà vale un risultato più forte (che richiede una dimostrazione che va oltre gli strumenti di Analisi I): la successione $(\alpha n \bmod 1)$ è *equidistribuita* in $[0, 1]$, vale a dire, per ogni $[a, b] \subseteq [0, 1]$ si ha

$$\lim_n \frac{|\{k \in \{1, \dots, n\} : \alpha k \bmod 1 \in [a, b]\}|}{n} = b - a$$

(si veda [1]).

Esercizio 18. Dimostrare che la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\cos n}}$$

è divergente.

Suggerimento: l'insieme $P := \{[(2n+1)\pi] : n \in \mathbb{N}^+\}$ ha densità naturale positiva (qui $[x]$ denota la parte intera del numero reale x).

Esercizio 19. Sia A il sottoinsieme di $\mathbb{N}^+$ di tutti gli interi positivi non contenenti la cifra 9 nella loro rappresentazione decimale. Dimostrare che la serie $\sum_{a \in A} \frac{1}{a}$ è convergente.

Esercizio 20. Dimostrare che gli intervalli $[0, 1]$ e $(0, 1)$ sono equipotenti, costruendo una biiezione $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$.

Esercizio 21. Sia (X, d) uno spazio metrico ed S un sottoinsieme connesso di X contenente almeno due punti. Dimostrare che S è più che numerabile.

Esercizio 22 (Lemma di Baire). Sia data una famiglia $C_n \subset \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, di sottoinsiemi chiusi di $\mathbb{R}$ a interno vuoto (vale a dire senza punti interni). Posto $C = \bigcup_n C_n$, dimostrare che anche C ha interno vuoto. Dedurre anche che, se $A_n \subset \mathbb{R}$ è aperto e denso per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora $\bigcap A_n$ è un insieme denso in $\mathbb{R}$ (in particolare non è vuoto).

Esercizio 23 (Insiemi G_δ). Un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ è detto *insieme G_δ* se è l'intersezione di una famiglia numerabile di insiemi aperti. Dimostrare che Q non è un insieme G_δ .

Esercizio 24. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$ definiamo

$$\omega_\delta(x) := \sup\{|f(y) - f(z)| : y, z \in (x - \delta, x + \delta)\}$$

e l'oscillazione di f in x

$$\omega(x) := \inf_{\delta > 0} \omega_\delta(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_\delta(x).$$

Dimostrare che:

- (a) f è continua in x se e solo se $\omega(x) = 0$;
- (b) per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, il sottolivello $\{x \in \mathbb{R} : \omega(x) < \alpha\}$ è aperto (in altri termini, la funzione ω è semicontinua superiormente);
- (c) l'insieme $\text{cont}(f)$ dei punti di continuità di f è un insieme G_δ (vale a dire, è l'intersezione di una famiglia numerabile di aperti);
- (d) non si può avere $\text{cont}(f) = \mathbb{Q}$;
- (e) esiste $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\text{cont}(f) = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Esercizio 25. Siano $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Dimostrare che

$$(a) \quad \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad (b) \quad \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^{2/3}} \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^{4/3}}.$$

Esercizio 26. Siano $x_i > 0$, $i = 1, \dots, n$, tali che $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Dimostrare che

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i + \frac{1}{x_i}\right)^2 \geq n^3 + 2n + \frac{1}{n}.$$

Esercizio 27. Un uomo in bicicletta percorre un tragitto di 77km in 7h; dimostrare che esiste un intervallo di un'ora dove ha percorso esattamente 11km.

Esercizio 28. Un uomo percorre un tragitto di T km in T ore. Dimostrare che, per ogni $\tau \in (0, T/2]$, esiste un intervallo di τ ore durante il quale ha percorso esattamente τ km. Mostrare, con un esempio, che se invece $\tau \in (T/2, T)$ non è detto che questo avvenga.

Esercizio 29. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua additiva, cioè tale che

$$(1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Dimostrare che f è una funzione lineare.

Esercizio 30 (Difficile). Dimostrare che esistono funzioni non lineari $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che $f(x + y) = f(x) + f(y)$ per ogni $x, y \in \mathbb{R}$.

Suggerimento: si usi il fatto che $\mathbb{R}$ può essere visto come spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$, e che come tale ammette una base di Hamel.

Esercizio 31. Caratterizzare le funzioni continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

- (a) $f(x)f(-x) = 1$;
- (b) $\lim_{h \rightarrow +\infty} f(x+h)f(x-h) = f(x)^2$.

Esercizio 32 (Congettura di Toeplitz). Sia $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che $f(x) > 0$ per ogni $x \in (0, 1)$ e $f(0) = f(1) = 0$. Diremo che un quadrato è inscritto nel grafico di f se esso ha due vertici sull'asse delle x e gli altri due sul grafico di f . Dimostrare che esiste almeno un quadrato inscritto nel grafico di f .

Esercizio 33. Dimostrare che una funzione $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, con I intervallo, è uniformemente continua se e solo se esiste una funzione (detta *modulo di continuità*) $\omega: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ tale che

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \omega(r) = 0 = \omega(0), \quad |f(x) - f(y)| \leq \omega(|x - y|) \quad \forall x, y \in I.$$

Si dimostri che, in tal caso, la funzione ω può essere scelta continua e monotona non decrescente.

Esercizio 34. Dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, si dimostri che la funzione

$$f(x) := \begin{cases} \exp(1/[(x-a)(x-b)]), & \text{se } x \in (a, b), \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus (a, b), \end{cases}$$

ammette derivate di ogni ordine.

Esercizio 35 (Prodotto di convoluzione). Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione localmente integrabile (cioè integrabile su ogni intervallo compatto), e sia $\rho: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^1 a supporto compatto (per un esempio di funzione di questo tipo si veda l'Esercizio 34). Definiamo il *prodotto di convoluzione*

$$(f * \rho)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(x-y)\rho(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Si dimostri che la funzione $f * \rho$ è derivabile e che $(f * \rho)' = f * \rho'$. (Suggerimento: osservare che ρ' è uniformemente continua.)

Esercizio 36. Sia $\rho: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione continua, non negativa, con supporto contenuto in $[-1, 1]$ e $\int_{-1}^1 \rho = 1$. Per ogni $n \in \mathbb{N}^+$ si definisca $\rho_n(x) := n\rho(nx)$, $x \in \mathbb{R}$. Dimostrare che, per ogni funzione $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f * \rho_n)(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(y)\rho_n(x-y) dy = f(x) \quad \forall x \in (a, b).$$

Cosa succede per $x = a$ o $x = b$?

Esercizio 37. Si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 1/q, & \text{se } x = p/q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+, \gcd(p, q) = 1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si dimostri che f è continua in x se e solo se x è irrazionale oppure $x = 0$.

Esercizio 38. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, derivabile in (a, b) e tale che $f(a) = f(b) = 0$. Dimostrare che, per ogni $k \in \mathbb{R}$, esiste $\xi = \xi(k) \in (a, b)$ tale che $f'(\xi) = k f(\xi)$.

Esercizio 39 (Lemma delle tre corde). Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo, una funzione convessa. Si dimostri che, se $x_1, x_2, x_3 \in I$ sono tali che $x_1 < x_2 < x_3$, allora

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

e si dia un'interpretazione geometrica di queste disuguaglianze. Da ciò dedurre che, in particolare, per $x \in I \setminus [x_1, x_2]$ il grafico di f non giace mai al di sotto della retta passante per i punti $P_1 = (x_1, f(x_1))$ e $P_2 = (x_2, f(x_2))$.

Esercizio 40. Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto.

(a) Dimostrare che f ammette in ogni punto derivata destra e sinistra (dunque, in particolare, è continua) e che, se $x, y \in I$, $x < y$, allora

$$(2) \quad f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'_-(y) \leq f'_+(y).$$

(b) Dimostrare che, se $x \in I$ e $p \in [f'_-(x), f'_+(x)]$, allora $f(y) \geq f(x) + p(y - x)$ per ogni $y \in I$.

Esercizio 41 (Disuguaglianza di Jensen). Sia $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa e sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione integrabile. Dimostrare che

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Esercizio 42. Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo e siano $f, g: I \rightarrow [0, +\infty)$ due funzioni convesse, non negative, entrambe monotone crescenti (oppure entrambe monotone decrescenti). Dimostrare che la funzione $h := f \cdot g$ è convessa.

Esercizio 43. Sia $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^2 , tale che $f, f', f'' \geq 0$ e $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, $f(2) = 4$, $f'(2) = 4$. Dimostrare che

$$[f(x)f(x+1) + 8] \cdot [f(x)f(2x) + 12] \geq 192x^2 \quad \forall x \in (0, +\infty).$$

Esercizio 44. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subset (0, +\infty)$, una funzione concava, tale che

$$\lambda := \frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b} \geq 0.$$

Dimostrare che

$$\frac{f(b) - f(a)}{\log b - \log a} \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Esercizio 45. Sia $f \in C^2([0, 1])$ tale che $\int_0^1 f(x) dx = 2 \int_{1/4}^{3/4} f(x) dx$. Dimostrare che esiste un punto $x_0 \in (0, 1)$ tale che $f''(x_0) = 0$.

Esercizio 46. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suriettiva e tale che per ogni $(x_n) \subset \mathbb{R}$ non convergente, $(f(x_n))$ sia non convergente. Provare che f è continua.

Esercizio 47. Siano $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue e almeno due volte derivabili che godano delle seguenti proprietà:

- (a) $f'(x) = g(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
- (b) $g'(x) = -f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
- (c) $f(0) = 0$, $g(0) = 1$.

Mostrare, senza fare uso della teoria delle equazioni differenziali, che:

- (i) $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;
- (ii) detto $\alpha > 0$ un numero reale tale che $g(x) > 0$ in $[0, \alpha]$, si ha che

$$f(x) \leq x \leq \frac{f(x)}{g(x)} \quad \forall x \in [0, \alpha].$$

Esercizio 48. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona crescente [risp. decrescente]. Dimostrare che la funzione integrale $F(x) := \int_a^x f$ è convessa [risp. concava] in $[a, b]$.

Esercizio 49. Sia $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

Si dimostri che f non è convessa.

Esercizio 50. Siano date due funzioni $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, con f monotona decrescente e g monotona crescente. Si assuma inoltre che $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. Dimostrare che

$$y \int_0^x f \geq x \int_0^y g \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

Esercizio 51. Caratterizzare le funzioni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivabili con derivata continua, soddisfacenti

$$(x - y)(f(x) - 1)^2 = -(x + y)(f(x) - f(y))(e^{f'(x)} - 1) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, |x| < y.$$

Esercizio 52. Caratterizzare le funzioni $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabili con derivata continua, soddisfacenti

$$0 < f'(x) \leq 1, \quad \forall x \in [0, 1], \quad f(0) = 0, \quad \int_0^1 f^2 = \frac{f(1)^3}{3}.$$

Esercizio 53. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, derivabile in (a, b) , tale che $f(a) \cdot f(b) \neq 0$. Sia $Z := \{x \in (a, b) : f(x) = 0\}$ l'insieme degli zeri di f , e supponiamo che $f'(z) \neq 0$ per ogni $z \in Z$. Si dimostri che:

- (a) Z è un insieme finito (eventualmente vuoto);
- (b) se $Z = \{z_1, \dots, z_n\}$, con $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ ed $n \geq 2$, allora $f'(z_j) \cdot f'(z_{j+1}) < 0$ per ogni $j = 1, \dots, n - 1$;
- (c) posto

$$d := \sum_{z \in Z} \text{sign } f'(z) \quad (d := 0 \text{ se } Z = \emptyset)$$

si ha $d \in \{-1, 0, 1\}$;

- (d) se $d \neq 0$, allora f ha almeno uno zero, cioè $Z \neq \emptyset$.

Esercizio 54. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile, soddisfacente

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{|x|} = +\infty.$$

Dimostrare che $f'(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ (cioè che f' è suriettiva).

Esercizio 55. Stabilire se la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0, \end{cases}$$

ammette primitive, vale a dire, se esiste una funzione $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile tale che $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esercizio 56. Si consideri la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x^2}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Dopo aver verificato che f è illimitata in ogni intorno dell'origine, si dimostri che f ammette primitive, vale a dire, esiste una funzione $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile tale che $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esercizio 57. Sia $f \in C^1([0, +\infty))$ e supponiamo che $\int_0^{+\infty} |f'(x)| dx < +\infty$. Dimostrare che

- (a) esiste finito $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$;
- (b) l'integrale generalizzato $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ è convergente se e solo se la serie numerica $\sum_n f(n)$ è convergente.

Esercizio 58. Sia $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione continua e decrescente, integrabile in senso generalizzato in $[0, +\infty)$. Si consideri la funzione

$$g(y) := \sum_{n=0}^{\infty} f(y+n), \quad y \in [0, 1].$$

Si dimostri che g è continua e monotona decrescente in $[0, 1]$, e che esiste $y \in [0, 1]$ tale che $g(y) = \int_0^{+\infty} f$.

Esercizio 59. (a) Dimostrare che la funzione $g(x) := (\sin x)/x$ è integrabile in senso generalizzato in $[1, +\infty)$.

- (b) Dimostrare che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{n}}{n}$ è convergente

Esercizio 60. Fissato $\lambda \in [-1, 1]$, sia

$$\mathcal{F}_\lambda := \{f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : |f(x) - f(y)| \leq |x - y| \forall x, y \in [0, 1], f(0) = 0, f(1) = \lambda\}.$$

Calcolare

$$I_\lambda := \sup \left\{ \int_0^1 f(x) dx : f \in \mathcal{F}_\lambda \right\}.$$

Esercizio 61. Sia data una successione $f_j: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $j \in \mathbb{N}$, di funzioni monotone crescenti. Si supponga che:

- (a) la successione sia equilimitata, cioè esiste $M > 0$ tale che $|f_j(x)| \leq M$ per ogni $x \in [a, b]$ e per ogni $j \in \mathbb{N}$;
- (b) la successione sia monotona crescente, cioè $f_j(x) \leq f_{j+1}(x)$ per ogni $x \in [a, b]$ e per ogni $j \in \mathbb{N}$.

Dimostrare che la successione converge puntualmente in $[a, b]$ ad una funzione f , anch'essa monotona crescente, e che

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} \int_a^b f_j(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Esercizio 62. Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme chiuso e non vuoto. Definiamo la funzione *distanza da C*

$$d_C(x) := \inf_{y \in C} |x - y|, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Si dimostri che l'estremo inferiore nella definizione di d_C è sempre raggiunto; si dimostri inoltre che d_C è una funzione 1-Lipschitziana, cioè che

$$|d_C(x) - d_C(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Esercizio 63. Sia $C \subset \mathbb{R}^n$ un insieme chiuso e non vuoto, e sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto contenente C , $A \neq \mathbb{R}^n$. Si dimostri che esiste una funzione continua $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ che vale 0 in C e 1 nel complementare di A , mentre è strettamente compresa fra 0 e 1 negli altri punti (Questo mostra, in particolare, che dato un qualsiasi insieme chiuso $C \subset \mathbb{R}^n$ esiste una funzione continua f tale che C coincide con l'insieme degli zeri di f .)

Esercizio 64. Siano $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni localmente integrabili, con $g(x) > 0$ per ogni $x \neq 0$. Sia inoltre $\rho: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione non negativa, a supporto compatto, integrabile con $\int \rho > 0$. Dimostrare che, se esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$, allora esiste anche il limite

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\int f(ry)\rho(y)dy}{\int g(ry)\rho(y)dy}$$

e vale anch'esso L .

Esercizio 65. Sia $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile, tale che

$$f(1) = 1, \quad f'(x) = \frac{1}{x^2 + f(x)^2} \quad \forall x \geq 1.$$

Dimostrare che esiste finito $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ed è strettamente compreso fra 1 e $1 + \pi/4$.

Esercizio 66. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione non decrescente, non costante. Dimostrare che esistono $a \in \mathbb{R}$ e $c > 0$ tali che

$$f(a+x) - f(a-x) \geq cx \quad \forall x \in [0, 1].$$

Esercizio 67 (Principio del Massimo). Sia $a: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua strettamente positiva, e sia $u: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, di classe C^2 in $(0, 1)$, tale che $u''(x) = a(x)u(x)$ per ogni $x \in (0, 1)$. Dimostrare che

- (a) se $x_0 \in (0, 1)$ è un punto di massimo relativo di u , allora $u(x_0) \leq 0$; analogamente, se $x_0 \in (0, 1)$ è un punto di minimo relativo di u , allora $u(x_0) \geq 0$;
- (b) se $u(0) = u(1) = 0$, allora u è identicamente nulla.

Esercizio 68. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, derivabile in (a, b) , tale che $f(a) = 0$ e $|f'(x)| \leq A|f(x)|$ per ogni $x \in (a, b)$, con A costante positiva. Dimostrare che f è identicamente nulla.

Esercizio 69. Sia $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, tale che

$$D^+ f(x) := \limsup_{y \rightarrow x^+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0 \quad \forall x \in [0, 1].$$

Dimostrare che f è monotona non decrescente.

Esercizio 70. Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile, con derivata f' Riemann-integrabile in $[a, b]$. Dimostrare che

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

Esercizio 71. Sia $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione monotona decrescente, integrabile in senso generalizzato. Dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

Esercizio 72 (Funzioni sub-armoniche). Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, tale che

$$f(x) \leq \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}, h > 0.$$

Dimostrare che

- (a) il massimo di f in ogni intervallo compatto $[a, b]$ viene raggiunto agli estremi;
- (ii) f è convessa.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] L. Kuipers and H. Niederreiter, Uniform distribution of sequences, Wiley-Interscience [John Wiley & Sons], New York, 1974, Pure and Applied Mathematics. MR 0419394 (54 #7415)