

Esercizi di algebra lineare (20 ottobre 2019)

Esercizio 1. Consideriamo $V = \mathbb{C}^2$ come spazio vettoriale su $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ e siano $v_1, v_2 \in V$ i vettori

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3i + 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} i \\ -3 + i \end{pmatrix}.$$

- (i) Dimostrare che (v_1, v_2) è una coppia di vettori in V linearmente indipendente (sul campo \mathbb{R}).
- (ii) Completare (v_1, v_2) ad una base di \mathbb{C}^2 (sul campo \mathbb{R}).

Esercizio 2. Sia $\mathbb{R}[t]_{\leq n}$ lo spazio vettoriale reale dei polinomi reali in t di grado al più n . Considerare l'applicazione $f : \mathbb{R}[t]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[t]_{\leq 2}$ definita come $f(p) := p(t+1) - p(t-1) - p(1)$.

- (i) Dimostrare che f è lineare.
- (ii) Dire se f sia iniettiva. Dire se f sia suriettiva.
- (iii) Determinare una base del nucleo e dell'immagine di f .

Esercizio 3. Fissiamo $n \geq 0$ un intero, e siano $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ distinti. Considerare l'applicazione $F : \mathbb{R}[x]_{\leq n} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ definita come

$$F(p) := (p(\alpha_0), p(\alpha_1), \dots, p(\alpha_n)).$$

- (a) Dimostrare che F è lineare ed è invertibile.
- (b) Per ogni $i = 0, \dots, n$ determinare $p_i \in \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ tale che $F(p_i) = e_{1+i}$, dove (e_1, \dots, e_{n+1}) è la base canonica di \mathbb{R}^{n+1} .
- (c) Determinare l'equazione $y = ax^2 + bx + c$ della parabola in \mathbb{R}^2 passante per i punti $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, -1)$.

Esercizio 4. Siano $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare suriettiva e $U \subseteq V$ un sottospazio vettoriale. La *restrizione* $f|_U : U \rightarrow W$ è definita come l'applicazione che soddisfa $f|_U(u) := f(u)$ per ogni $u \in U$. Dimostrare che la restrizione $f|_U : U \rightarrow W$ è un invertibile se e solo U è complementare di $\ker(f)$ in V , ossia $V = U \oplus \ker(f)$.

Esercizio 5. Una applicazione lineare $f : V \rightarrow V$ si dice *proiezione* se $f = f \circ f$. Dimostrare che, se f è una proiezione, allora $f(v) = v$ per ogni $v \in \text{Im}(f)$, e valgono

$$V = \ker(f) \oplus \text{Im}(f), \quad e \quad \text{Im}(f) = \ker(\text{Id} - f).$$